

КУЛТУРИ	ДОЗИРОВКА (kg/Ha)	ФАЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
ОВОШНИ ДЪРВЕТА		
КОСТИЛКОВИ (праскова, слива, череша, кайсия)	100	Множество приложения при следните условия: предцъфтежно, при поява на плодовете, 30 дни преди беритба
СЕМКОВИ	30-40	При начало на вегетацията
крушови дървета	30-40	При нарастване на плодовете
	50	След прибиране на богата реколта
Ябълкови дървета	60-80	След цъфтеж
	50-60	При нараставане на плод
КИВИ	25	При поява на първите пъпки (смесено с желязна хелати)
	25	След месец (второ прилагане с желязени хелати)
	75-100	2-3 прилагания между засаждането и формирането на плодове
	50	След прибиране на богата реколта
ЛОЗЯ (десертни и винени лозя)	25-50	При пробуждане (прилагат се по-малки дози за винени сортове)
	25-50	При нарастване на зърната
ЦИТРУСИ	50	Края на Януари
	50-60	След цъфтеж
	50-100	Когато плодовете започнат да порастват
МАСЛИНОВИ ДЪРВЕТА	50-100	Края на зимата, преди цъфтеж
		След поява на плод (2-3 приложения)
ЯГОДИ	25	След пресаждане
	25-50	След етап на формиране на цветовете
	25	Преди цъфтеж
	25	При наедряване на плод
	25	След всяка беритба
МАЛИНИ, КАСИС	50-100	При начало на вегетация
		При нарастващ плод
ГРАДИНСКИ НАСАЖДЕНИЯ		
АСПЕРЖИ	25-50	Преди покълване
	25-50	Края на лятото, след подрязване на филизите
Градински ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ПИПЕР	25	След засаждане
	25-50	Преди цъфтеж и нарастване на плодове
Парникови ДОМАТИ, КРАСТАВИЦИ, ПИПЕР	25	След засаждане
	25-50	Преди цъфтеж
	25-50	Наедряване на плодове
ДИНИ - ПЪПЕШИ	25	След засаждане
	25-50	Преди цъфтеж
	25-50	При започване наедряването
КАРТОФИ	50-75	При посяване на семената
	50-75	Преди цъфтеж
Листни зеленчукови култури (общо)	75-150	Според жизнения цикъл на културите
Маслодайна роза, лавандула, мента	30- 50	Начало на вегетацията
ПШЕНИЦА	50-100	Листно или почвено приложение (при братене)
ЦАРЕВИЦА, СОРГО, СОЯ, ЦВЕКЛО	50-100	След поникване
ОРИЗ	50-100	След поникване
ЛЮЦЕРНА	25	След първо подрязване

HEMOZYM BIO N5 се предлага в туби 25/1.000 кг